



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0073

鋰齊寧[®]膠囊

Ligilin[®] 300 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

鋰齊寧[®]膠囊 (Ligilin[®] 300 mg)

2008.02 修訂

藥品成分名：Lithium carbonate

藥品外觀：淡黃橙色，長圓柱形，硬膠囊；大小：3號；標記：[SOLVAY][7512]

作用

鋰齊寧[®]膠囊情緒改善與調節。

用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有腎、心臟疾病，應告知您的醫師及藥師。
2. 已知對本藥產生過敏反應者不建議使用。
3. 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

忘記服藥怎麼辦？

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若發生以下情形，請您不用過於擔心：噁心、腹瀉、眩暈、手指顫抖、多尿、口渴、肌肉無力、昏睡、厭食、便秘、胃腸道不適、頭痛等。當上述的症狀若持續且加重，請與您的醫師聯絡。

保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 儲存於原始容器中。
3. 避免放在孩童可以取得的場所。
4. 若藥品超過保存期限請丟棄。
5. 勿將您的藥物提供給他人使用。