



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0024

伏糖[®]膜衣錠

Loditon[®] 500 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

伏糖[®]膜衣錠(Loditon[®] 500 mg)

2010.05 修訂

藥品成分名：Metformin

藥品外觀：白色，圓形，錠劑；大小：1.1 公分
；標記：[STD][L/09]

作用

為口服的抗糖尿病製劑，主要治療第二型糖尿病，以控制您的血糖接近正常值。

用法

1. 按照醫生的指示服用。
2. 建議飯後立即服用，可以減輕其腸胃道副作用。

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 對具胰島素阻抗而不排卵之停經前婦女，可能會造成排卵，因此可增加懷孕的機率，可能需要作避孕的措施。
3. 配合醫生指示控制飲食和適量運動才能有效控制糖尿病症狀，有助於您的健康。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於緊張：噁心、嘔吐、腹痛、味覺異常、體重下降等腸胃道副作用。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：尿液顏色變深、皮膚或眼睛產生黃疸、呼吸困難的情形，請立即就醫！
3. 服用可能造成低血糖症狀請小心(請見低血糖症狀處理方法)。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

發生低血糖該怎麼辦？

★ 症狀：

顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。

★ 處理方式：

1. 血糖值小於 70 mg/dl：立即服用 120-180 毫升果汁或糖果 8-10 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
2. 血糖值小於 50 mg/dl：立即服用 180-250 毫升果汁或糖果 10-15 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
3. 若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。

發生高血糖該怎麼辦？

★ 症狀：

例如異常口渴、疲倦、皮膚乾燥、呼吸困難、頻尿、沒胃口等。

★ 處理方式：

請測量血糖值並立即與您的醫師聯絡。