



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0014

美道普[®]錠

Madopar[®] 250 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

美道普[®]錠(Madopar[®] 250 mg)

2007.02 修訂

藥品成分名：Levodopa/Benserazide

藥品外觀：淡紅色，圓扁形，錠劑；大小：1.30 公分；標記：[RO，C，HE]

作用

美道普[®]錠是一種控制帕金森氏症藥物。

用法

1. 美道普[®]錠請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
2. 美道普[®]錠需從低劑量開始服用，再慢慢增加劑量以達到最適合您的療效。

注意事項

1. 對美道普[®]錠過敏，請勿使用此藥。
2. 美道普[®]錠和許多藥都有可能產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 若您正服用抗癲癇藥(如：Phenytoin)、紅黴素(Erythromycin)、抗黴菌藥(如：Ketoconazole)、其他抗精神病藥物、降血壓藥，請告知您的醫師。
4. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心血管疾病、肝病、甲狀腺疾病、癲癇、阿茲海默症，及正服用其他藥物者，請先告知您的醫師。
5. 不要喝酒精性飲料，請勿自行服用未經醫師處方的藥品。
6. 服用美道普[®]錠期間，請按時回診及定期接受視力檢查。
7. 可能會讓您覺得頭暈，動作不協調、視線模糊、困倦，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。從事具潛在危險之活動(如開車、騎腳踏車、游泳等)應有人陪同。
8. 可能會使您容易體溫升高，當您運動或天氣較熱時，多喝水會對您有幫助。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。

副作用

症狀	如何處理
頭暈	通常發生在剛開始服藥或改變劑量時，若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
動作無法控制(常發生在嘴唇、舌頭、四肢)、心跳過快、發燒、盜汗、意識混淆、癲癇發作、肌肉僵直、視覺模糊有光暈、吞嚥困難、困倦	請立即與醫師聯繫

保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
避免放在孩童可以取得的場所。
2. 請勿讓他人服用您的藥品。