



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0075



美舒鬱[®]錠
Mesyrel[®] 50 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

美舒鬱[®]錠(Mesyrel[®] 50 mg)

2008.02 修訂

藥品成分名：Trazodone

藥品外觀：淡紅橙，圓扁形，錠劑；大小：0.80 公分；標記：[LO]

作用

美舒鬱[®]錠具有調節情緒作用。

用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 避免喝酒。
3. 服藥期間請勿操作機器或開車。
4. 服用本藥治療期間，容易造成跌倒意外，請小心行動，以免發生危險。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，服藥初期最常出現鎮靜和思睡，請您不用驚慌，通常持續治療後消失。
2. 其他副作用包括：頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、體重減輕、震顫、口乾、心搏過慢或過快、姿態性低血壓、便秘、下痢、視覺模糊、痙攣、水腫及皮膚疹等。
3. 當上述的症狀若持續且加重，請與您的醫師聯絡。

保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 儲存於原始容器中。
3. 避免放在孩童可以取得的場所。
4. 若藥品超過保存期限請丟棄。
5. 勿將您的藥物提供給他人使用。