



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0077



敏樂朗[®]錠
Mizollen[®] 10 mg



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

敏樂朗[®]錠(Mizollen[®] 10 mg)

2008.02 修訂

藥品成分名：Mizolastine

藥品外觀：白色，橢圓形，錠劑；大小：1.2 公分；
標記：[MZ,10]

作用

敏樂朗[®]錠為口服的抗組織胺製劑，用於治療季節性過敏性鼻結膜炎，常年的過敏性鼻結膜炎及蕁麻疹症狀。

用法

1. 適用於成人及 12 歲以上小孩。
2. 建議每日劑量為 10mg。

注意事項

1. 若您有肝、心臟疾病（心律不整），應先告知您的醫生及藥師。
2. 在藥物作用下，有可能有嗜睡及全身無力現象產生，經常是短暫的，但仍須小心，避免因注意力不集中而有跌倒情形發生。
3. 授乳婦不建議使用本藥。

4. 孕婦應避免使用本藥，尤其是前三個月。
5. 從事駕駛、操作機械或複雜性工作者，請小心。
6. 老年人對此藥效果較敏感，須小心使用。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有嗜睡及全身無力情形，請不用擔心。
2. 有些病患會有食慾增加的現象，口乾、腹瀉、消化不良、頭痛也有可能發生。極少數病例出現低血壓或憂鬱症狀！

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。

3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

