



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0079

納催離<sup>®</sup>持續性藥效膜衣

**Natrilix SR<sup>®</sup> 1.5 mg**



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 納催離<sup>®</sup>持續性藥效膜衣錠

## (NatriliX SR<sup>®</sup> 1.5 mg)

2007.02 修訂

藥品成分名：Indapamide

藥品外觀：白色，圓凸形，錠劑；大小：0.81 公分；  
標記：無

### 作用

納催離<sup>®</sup>持續性藥效膜衣錠為口服的利尿劑。主要用以治療高血壓。

### 用法

1. 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
2. 每隔 24 小時服用一錠，最好於早晨服用。
3. 本劑應以水吞服，不可嚼碎。

### 注意事項

1. 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
2. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
3. 懷孕婦女絕對不可服用此類利尿劑，其有危害胎兒發育的危險性。

4. 服用納催離<sup>®</sup>持續性藥效膜衣錠不會影響警覺性，但有些病人可能受血壓降下影響，尤其是治療初期，會影響開車或機械操作。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：頭暈、疲倦、消化不良、皮下疹。
2. 服用納催離<sup>®</sup>持續性藥效膜衣錠可能會增加病患如廁的頻率，由病床至如廁的整個過程容易跌倒，須小心注意。

### 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。