



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0081

鎮頑癲<sup>®</sup> 膜衣錠

Neurontin<sup>®</sup> 600 mg



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434

E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

# 鎮頑癲<sup>®</sup>膜衣錠(Neurontin<sup>®</sup> 600 mg)

2008.02 修訂

藥品成分名：Gabapentin

藥品外觀：白色，橢圓形，錠劑，大小：1.7 公分，  
標記：[NT，16]

## 作用

1. 輔助治療成人及三歲以上兒童之局部癲癇發作。
2. 帶狀疱疹後神經痛

## 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 可空腹或隨餐服用
3. 使用 Gabapentin 的間隔時間不可超過 12 小時，  
以免發生抽搐

## 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 須定期看醫生檢查治療進度，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，須以遞減方式避免癲癇復發。
3. 不適用於 3 歲以下兒童之癲癇輔助治療，以及未

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

## 滿 18 歲患者之神經痛治療

4. 若為腎功能不全或進行血液透析的患者，需作劑量上的調整
5. 同時接受 morphine 治療的患者，其 gabapentin 濃度可能會升高，應小心觀察患者是否出現嗜眠等症狀，也應適當減低用藥劑量。
6. 若須與含有鎂或鋁的制酸劑併用，建議應在服用制酸劑之後 2 小時再服用 Gabapentin。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 使用 Gabapentin 單一療法，不良反應的嚴重程度通查為輕至中度。
2. 可能發生包括眼球震顫、運動失調，頭暈、嗜眠噁心嘔吐等副作用。

### 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

### 可能增加跌倒的風險

1. 服用此藥可能會產生暈眩、嗜睡、運動失調等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。
2. 患者若癲癇發作時，也會增加跌倒風險。