



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0082



蕾莎瓦[®]膜衣錠
Nexavar[®] 200 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

蕾莎瓦[®]膜衣錠 (Nexavar[®] 200 mg)

2009.12 修訂

藥品成分名： Sorafenib

藥品外觀：淡紅色，圓扁形，錠劑；大小：1.0 公分；

標記：[特殊標記][200]

作用

作用在腫瘤細胞上，抑制癌細胞生長。

用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 必須空腹服用，建議飯前一小時或飯後兩小時服用。

注意事項

1. 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
2. 有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫（藥）師。
3. 若您有服用以下藥物，如：阿斯匹靈、止痛劑、抗凝血劑等請告知您的醫（藥）師。
4. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。

5. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
6. 當您有手或腳水腫時，建議可穿棉襪或軟鞋，以避免患處受到過多的壓力，並應避免長時間站立。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、手或腳水腫、視力模糊、胸悶、糞便或尿液顏色變深、頭暈、倦怠、發燒、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、體重減輕、落髮。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

