



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0083



耐福力<sup>®</sup>散  
Niflec<sup>®</sup> Powder



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 耐福力<sup>®</sup>散( Niflec<sup>®</sup> Powder )

2008 02 修訂

藥品成分組成：耐福力散(137.15g)內含

Sodium chloride	21.3g
Potassium chloride	10.8g
Sodium bicarbonate	24.5g
Sodium sulfate anhydrous	82.9g

## 作用

大腸內視鏡檢查及大腸手術前淨腸。

## 用法

- 1.請照醫生處方使用，取本品一袋以水溶成 2 公升後使用，成人以每小時約 1 公升的速度經口服方式投藥。一直到排泄物變透明為止，最多不要超過 4 公升。
- 2.檢查與定時間前 4 小時開始投與。大腸手術前的處理：手術前一天午餐吃過後開始禁食(只可攝取水份)，午餐過後 3 小時開始投藥。

## 注意事項

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 2.若有腸胃道閉塞、腸穿孔、中毒性巨大結腸症者請

勿投與。

- 3.若有狹心症、習慣性心肌梗塞者，因偶爾會有胸痛現象發生應謹慎投與。
- 4.若有腎機能障礙者因偶爾出現嘔吐現象，應謹慎投與。
- 5.如廁時請小心以防跌倒。

### 忘記服藥怎麼辦？

- 1.若您發現忘了使用藥品時，請盡速通知醫生或醫護人員另排時間檢查或手術。

### 可能的副作用

- 1.當大量液體投與會引起不適：腹部脹滿感、腹痛、反胃、噁心、頭痛、肛門部疼痛。請不需驚慌擔心。
- 2.若腹絞痛持續嚴重且有不尋常之腸道出血，請立即停藥並就醫！

### 保存方法

- 1.儲存於陰涼乾燥處、避光保存。
- 2.避免放在孩童可以取得的場所。
- 3.藥品若開封溶解後請盡速於48小時內服用並於冷冰箱(4度)保存。
- 4.勿將您的藥物提供給他人使用。

## 預防藥物造成跌倒

★ 使用峻瀉劑會增加病患如廁頻率，故在病患上下床間請攙扶以防跌到，病患於如廁時應注意地板是否積水以防滑倒。

★ 預防方式：

1. 於如廁或上下樓梯時請緊握扶手站穩踏階以防跌倒受傷。
2. 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。

