



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0085

諾安命[®]錠

Novamin[®] 5 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

諾安命[®]錠(Novamin[®] 5 mg)2008.02 修訂

藥品成分名：Prochlorperazine

藥品外觀：白色，圓扁形，錠劑；大小：0.7公分；

標記：[095]

作用

諾安命[®]錠為口服抗精神病製劑，主要之臨床用途有止吐、鎮靜、調整精神狀態。

用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 本藥須視需要或耐藥性逐漸調整劑量。

注意事項

1. 若您有計畫(已)懷孕、哺乳、心血管疾病、青光眼、肝功能障礙、巴金森氏症、消化性潰瘍、前列腺肥大請告知您的醫師或藥師。
2. 本藥與食物併服可降低對胃的刺激性，服後一小

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

時內不可服用制酸劑或瀉劑。

3. 使用本藥可能會影響駕駛和機械操作能力，執行此類動作時請加以注意。

忘了服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：姿勢性低血壓，便秘，思睡，暈眩。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：肌肉痙攣，頭臉部抽搐動作，手與指頭顫抖與搖晃，血壓過低，發燒，眼睛皮膚變黃的情形，請立即就醫！

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。

3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

注意跌倒之預防

用諾安命錠，可能會造成姿勢性低血壓，暈眩，鎮靜思睡，不安，曳足而行，頭臉部抽搐動作，手與指頭顫抖與搖晃等易跌倒之副作用。

服用此藥的期間，需特別注意跌倒的預防，請勿由躺著或坐著突然站立，尤其是初次使用，長期使用病患服用劑量的增加，或是年老之病患。