



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0028



諾和隆[®]錠
NovoNorm[®] 0.5 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

諾和隆[®]錠 (NovoNorm[®] 0.5 mg)

2009.12 修訂

藥品成分名：Repaglinide

藥品外觀：淡黃橙，圓扁型，錠劑；大小：0.62 公分

作用

諾和隆[®]錠用來治療第二型糖尿病患者（非胰島素依賴型），並藉由促進胰臟分泌胰島素，使血糖維持在正常值。

用法

1. 請遵照醫生指示服藥，通常一天配合正餐服用。
請於飯前 10-15 分鐘內服用，或服用後立即用餐。
2. 若未用餐則不須服藥。
3. 若多吃一餐，請在飯前多服用一劑量之此藥物。
4. 不可因為覺得沒有不舒服的症狀而自行停藥。

注意事項

1. 若您有以下情形，請告知您的醫(藥)師。
 - A. 若您是孕婦、哺乳中婦女、有肝腎方面疾病者。
 - B. 若您對諾和隆[®]錠過敏。
 - C. 若您有服用其它藥物(包括自行在藥房購買的)。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

2. 故請勿將本藥與含酒精的飲料併服。
3. 配合醫生指示控制飲食和適量運動將有助於您的健康。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一個藥都會有副作用，若您出現腸胃不適、腹瀉、便秘、消化不良、鼻塞、流鼻水、關節痠痛、背痛，請勿過於緊張。若上述症狀持續且加重，請聯絡您的醫師。
2. 服用諾和隆[®]錠極少會造成低血糖情形，不過若是發生以下症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。當這些症狀發生時可立即服用一杯果汁或糖果數

顆，並測量血糖值。若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。

3. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。
4. 若發生高血糖症狀：例如異常口渴、疲倦、皮膚乾燥、呼吸困難、頻尿、沒胃口等，請測量血糖值並立即與您的醫師聯絡。

保存方法

1. 請將藥品儲存於室溫，避免光照和潮濕。
2. 應該置放於兒童伸手不及處。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄，並請不要將您的藥給他人服用。