



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0087

苯巴比妥<sup>®</sup>錠

Phenobarbital<sup>®</sup> 30 mg



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 苯巴比妥<sup>®</sup>錠(Phenobarbital<sup>®</sup> 30 mg)

2008.02 修訂

藥品成分名： Phenobarbital

藥品外觀：淡紅，圓扁形，錠劑；大小：0.85 公分；

標記：[U，L]

## 作用

特別用於癲癇大發作。

## 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 可空腹或與食物併服。

## 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 須定期看醫生檢查治療進度，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，須以遞減方式避免癲癇復發。
3. 若為老年人、肝腎功能不佳的患者，需謹慎評估後給予。
4. 會分泌至母乳中，因此不建議在治療期間哺乳。
5. 酒精會增加此藥的鎮靜作用，盡可能避免。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

## 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## 可能的副作用

1. 常見的副作用為暈眩、嗜睡、頭痛、注意力不集中、興奮(特別在小孩)。
2. 有時會發生食慾不振、噁心嘔吐等副作用。

## 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

## 可能增加跌倒的風險

1. 服用此藥可能會產生暈眩、嗜睡、注意力不集中等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。
2. 患者若癲癇發作時，也會增加跌倒風險。

