



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0023

腹寧朗[®]膜衣錠

Primperan[®] 5 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

腹寧朗[®]膜衣錠(Primperan[®] 5 mg)

2009.12 修訂

藥品成分名：Metoclopramide

藥品外觀：白色，圓扁形，錠劑；大小：0.60 公分；
標記：[P5]

作用

腹寧朗[®]錠可用於紓解噁心、嘔吐、胃灼熱、腹部疼痛、脹氣、食慾不振，亦可用來增進腸胃蠕動。

用法

1. 腹寧朗[®]錠請遵照醫師指示服藥。
2. 腹寧朗[®]錠飯前服用效果較好。

注意事項

1. 對腹寧朗[®]錠過敏，請勿使用此藥。
2. 若患有癲癇、帕金森氏症、出血、腸阻塞疾病、腎上腺瘤等疾病，不適合使用腹寧朗[®]錠。
3. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有高血壓、心、肝、腎、帕金森氏症、精神方面等疾病，及正服用其他藥物者，請先告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

4. 服用腹寧朗[®]錠期間請勿喝酒，酒精易增加藥品昏睡的副作用。
5. 腹寧朗[®]錠可能會讓您覺得頭暈、嗜睡，在未確定此藥對您有何影響之前如需開車或操作危險機械，請務必特別注意。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。

可能的副作用

症狀	如何處理
便秘或腹瀉、疲倦	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
心跳異常，頭暈，四肢水腫，癲癇發作，嚴重肌肉僵直、手抖、痙攣，臉部、眼睛、舌頭、頸部、頭部的不自主運動，呼吸困難	請立即與醫師聯繫

保存方法

1. 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

