



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0133



普樂可復<sup>®</sup>膠囊  
Prograf<sup>®</sup> 1mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

# 普樂可復<sup>®</sup>膠囊( Prograf<sup>®</sup> 1mg )

2011.1 訂

藥品成分名：Tacrolimus (FK506)

藥品外觀：白色，長圓柱形，硬膠囊；標記：[1mg]  
[特殊標記；617]

## 作用

普樂可復<sup>®</sup>膠囊為口服的免疫抑制劑，可預防器官移植後之排斥反應。有時也會用於治療某些自體免疫疾病，如牛皮癬、乾癬等。

## 用法

1. 每隔 12 小時服用一次，盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。切勿擅自停藥或更改劑量。
2. 與山喜多(Cellcept<sup>®</sup>)併用時，兩者至少相隔 2 小時，以免腸胃不適。

## 忘記服藥怎麼辦

1. 發現時趕快服下，若距離下次吃藥時間是小於 4 小時以內，則省去已忘記吃的藥量，只需按照時間服用下一次藥量，絕對不要服用雙倍藥量。
2. 若忘記 2 劑以上，應與您的醫師聯絡。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

## 注意事項

1. 服藥期間請勿吃葡萄柚或喝葡萄柚汁，以免使得普樂可復之血中濃度異常升高。
2. 必須定期抽血檢查藥物血中濃度。一般是檢查吃藥前的血中濃度( 5-20 ng/ml )。
3. 服藥期間會是免疫力下降，應避免出入人潮多的地方，或接觸有感冒或其他感染症的人。並保持個人衛生。
4. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。

## 可能的副作用

1. 副作用的發生因人而異，若有以下情形，請告訴醫師或藥師：手部顫抖、血壓上升、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、失眠、掉髮等。
2. 若服藥後出現過敏反應(呼吸困難、臉部腫脹)、異常瘀青或出血、排尿減少或疼痛、發燒、感覺異常等症狀，請立即就醫。

## 藥品保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

## 藥品交互作用

服用普樂可復期間未經醫師同意，請勿自行服用其他處方藥物或中草藥。

1. 會增加普樂可復血中濃度之藥品，例如：巨環類抗生素(erythromycin、clarithromycin)，鈣離子通道阻斷劑(diltiazem、verapamil、nicardipine)，Azole 類抗黴菌藥(itraconazole、ketoconazole、fluconazole)等。
2. 會降低普樂可復血中濃度之藥品，例如：抗癲癇藥(carbamazepine、phenytoin、phenobarbital)、抗結核菌藥(rifampin、isoniazide)等。
3. 若與含鎂、鋁成分之胃藥一起服用，會降低普樂可復之血中濃度，所以使用時需間隔2小時以上。