



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0090



來喜妥[®]錠
Rasitol[®] 40 mg



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

來喜妥[®]錠 (Rasitol[®] 40 mg)

2007.02 修訂

藥品成分名：Furosemide

藥品外觀：淡綠色，橢圓形，錠劑；

大小：0.88 公分；標記：[YSP126]

作用

來喜妥[®]錠為口服的利尿劑，主要用來治療高血壓、充血性心衰竭、消除水腫。

用法

1. 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
2. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。

注意事項

1. 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
2. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
3. 懷孕婦女及授乳婦女禁止使用來喜妥[®]錠。
4. 不宜在就寢前或外出散步前使用來喜妥[®]錠。
5. 若您有肝腎方面的疾病，請告知您的醫(藥)師。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：心跳加快、失眠、腸胃不適、噁心嘔吐。
2. 服用來喜妥[®]錠可能會增加病患如廁的頻率，由病床至如廁的整個過程容易跌倒，須小心注意。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。