



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0091

理思必妥[®]錠

Risperdal[®] 3 mg



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

理思必妥[®]錠 (Risperdal[®] 3 mg)

2010.05 修訂

藥品成分名：risperidone

藥品外觀：鮮黃色，長圓柱形，錠劑；大小：1.4 公分；標記：[Ris, 3]

作用

理思必妥[®]錠為口服抗精神病製劑，主要適應症為精神分裂症之相關症狀，雙極性疾患之躁症發作，失智症病人具嚴重攻擊性或精神分裂症之類似症狀。

用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 如果是每日服用一次的話，可於早晨一次服用；如果是分成每日兩次服用的話，可於早晨和傍晚各服用一次。

注意事項

1. 失智老人使用此藥與利尿劑並服，尤其是 Furosemide(本院為 Rasitol[®])，要小心以防脫水。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

2. 本藥應小心使用於已知有心臟血管疾病或相關危險、肝腎功能不全患者，如果您有相關疾病請主動告知您的醫師或藥師。
3. 使用本藥可能會影響駕駛和機械操作能力，執行此類動作時請加以注意。

忘了服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：失眠，躁動不安，焦慮，頭痛，。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：嗜眠、視力模糊、高燒、肌肉僵直等請立即就醫！

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。

2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

注意跌倒之預防

服用理思必妥錠，易造成姿勢性低血壓，暈眩，鎮靜等副作用。

服用此藥的期間，需特別注意跌倒的預防，請勿由躺著或坐著突然站立，尤其是初次使用，長期使用病患服用劑量的增加，或是年老之病患。