



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0093



救癲易[®]膜衣錠
Sabril[®] 500 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

救癲易[®] 膜衣錠(Sabril[®] 500 mg)

2008.02 修訂

藥品成分名：Vigabatrin

藥品外觀：白色，橢圓形，錠劑，大小：1.70 公分，
標記：[SABRIL]

作用

救癲易[®] 膜衣錠的作用為癲癇之輔助療法

用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 可飯前或飯後服用
3. 不適用於單獨治療給藥

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 須定期看醫生檢查治療進度，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，須以遞減方式避免癲癇復發。
3. 老年人或腎功能不全之患者，應考慮調整劑量或服用次數，避免副作用產生。
4. Vigabatrin 會分泌至母乳中，因此不建議在治療

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

期間哺乳。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 於成人，大部粉與中樞神經系統有關，如鎮靜作用、嗜眠、疲倦、注意力不能集中。
2. 於孩童中，則較常發生興奮或精神激昂。
3. 其餘發生率較高的副作用為視覺障礙

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

可能增加跌倒的風險

1. 服用此藥物可能會產生鎮靜、嗜眠、注意力不集中、視覺障礙等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。
2. 患者若癲癇發作時，也會增加跌倒風險。

