




臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0095



仙塞落[®]糖衣錠

Sennoside[®] Tablets



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 2113 或 1105
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

仙塞落[®]糖衣錠(Sennoside[®] Tablets)

2008 02 修訂

藥品成分組成：仙塞落糖衣錠(20mg)每顆內含 Sennoside A+B 鈣鹽 12mg。

藥品外觀：淺紅色，圓凸型；大小：0.6 公分；標記：[SW，157]。

作用

增加腸蠕動與促進液體蓄積於大腸而產生緩瀉作用；用在緩解便秘。

用法

- 1.仙塞落錠作用緩慢，服用後 8 到 10 小時後開始發揮功效，因此就在就寢前服用，翌晨即可看出效果。
- 2.成人一日可服用 1 到 2 錠，可依年齡、症狀適量增減。

注意事項

- 1.長期使用會產生依賴，使腸道失去原有機能。
- 2.請多補充水分幫助排便。
- 3.請勿磨碎、剝半等破壞藥物劑型，避免胃部產生刺激感。
- 4.如廁時請小心以防跌倒、滑倒。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 最常見之副作用請不用驚慌：腸道過度活動如：腹絞痛、腹痛、打嗝、噁心，電解質失衡等。
2. 若有過敏反應，如虛弱、暈眩、心悸、劇烈絞痛、血便或肛門出血等，請立即停藥並就醫！

保存方法

1. 儲存於陰涼乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄，一般效期為開立期限後三個月內。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

預防藥物造成跌倒

- ★ 使用緩瀉劑會增加病患如廁頻率，故在病患上下床間請攙扶以防跌到，病患於如廁時應注意地板是否積水以防滑倒。
- ★ 預防方式：

1. 於如廁或上下樓梯時請緊握扶手站穩踏階以防跌倒受傷。
2. 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。

