



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0096



心益[®] 糖衣錠

Serenal[®] 10mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

心益[®]糖衣錠(Serenal[®] 10mg)

藥品成分名：Oxazolam

藥品外觀：藥品外觀：白色圓形雙凸錠劑；標記：
[SANKYO 107]

作用

是一種苯二酚(Benzodiazepine)類的藥物，主要用於緩解焦慮及緊張感。

用法

請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

注意事項

1. 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
2. 使用此藥品前請勿吸煙、喝含酒精性的飲料及葡萄柚汁。
3. 使用此藥品後請勿開車或操縱精密的儀器，並小心走路預防可能發生的跌倒。
4. 在手術前需告訴醫生或藥師是否有其他併存的疾病(例如：中風、憂鬱症、心臟疾病、青光眼、肝腎疾病、肺部及呼吸道的疾病、帕金森氏症、癲癇、重症肌無力等等)。

5. 若有服用其他藥物(包括保健食品)請先告知醫生或藥師。
6. 若有計劃懷孕(或是已經懷孕)及哺乳婦女者，請先告知醫生。
7. 對苯二酚(Benzodiazepine)類過敏者須在使用前告知醫生
8. 若需要進行其他手術或牙科處置時，需告知醫生。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：嗜睡、暈眩、疲倦、頭痛、噁心、皮膚癢、情緒不穩、暫時性的失憶、低血壓等；通常只會出現在治療初期，繼續服用後通常症狀都會漸漸消失。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：憂鬱、睡眠障礙、不安、焦慮、心跳加快、講話困難、無法控制肌肉等，請立即就醫。

保存方法

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

1. 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

