



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0016



思樂康[®]錠
Seroquel[®] 100 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

思樂康[®]錠 (Seroquel[®] 100 mg)

2009.12 修訂

藥品成分名：Quetiapine

藥品外觀：淡黃橙色，圓扁形，錠劑；大小：0.90
公分；標記：[SEROQUEL，100]

作用

思樂康[®]錠是一種非典型抗精神病藥物，可用於治療精神分裂症，也可用於治療躁鬱症。

用法

1. 思樂康[®]錠劑量請遵照醫師指示服藥。
2. 思樂康[®]錠請遵照醫師指示服藥勿自行更改劑量或停藥。
3. 思樂康[®]錠需從低劑量開始服用，再慢慢增加劑量以達到最適合您的療效。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

注意事項

1. 對思樂康[®]錠過敏，請勿使用此藥。
2. 思樂康[®]錠和許多藥都有可能產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。
3. 若您正服用抗癲癇藥(如：Phenytoin)、紅黴素(Erythromycin)、抗黴菌藥(如：Ketoconazole)、其他抗精神病藥物、降血壓藥，請告知您的醫師。
4. 評估認為治療效益大於潛在危險時，才能在懷孕期間使用思樂康[®]錠。藥品分泌到人類乳汁的程度尚未知，婦女在服用思樂康[®]錠期間，最好避免以母乳哺育。
5. 不要喝酒精性飲料，請勿自行服用未經醫師處方的藥品。
6. 服用思樂康[®]錠期間，請按時回診及定期接受視力檢查。
7. 思樂康[®]錠可能會讓您覺得頭暈，動作不協調、視線模糊、困倦，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。從事具潛在危險之活動(如開車、騎腳踏車、游泳等)應有人陪同。
8. 思樂康[®]錠可能會使您容易體溫升高，當您運動或天氣較熱時，多喝水會對您有幫助。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。

副作用

症狀	如何處理
頭暈、嗜睡、口乾、輕微無力、便秘、心搏過速、姿勢性低血壓、消化不良	通常發生在剛開始服藥或改變劑量時，若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫

保存方式

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。
2. 請勿讓他人服用您的藥品。