



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0131



芪偶素[®]腸溶錠

Stilbestrol[®] 1mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

芪偶素[®]腸溶錠 (Stilbestrol[®] 1mg)

2011.02 修訂

藥品成分名：Diethylstilbestrol

藥品外觀：紅色，圓形，雙凸錠劑。

作用

本藥具有抗雄性激素作用，主要治療前列腺癌。

用法

1. 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
2. 一般使用劑量：起始劑量一天1~3mg，視情況調整。

注意事項

1. 有肝、心臟血管以及腎臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 本藥會有可能造成血栓，使用期間請注意身體狀況。
3. 若發生陰道出血，請告知醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

4. 服用本藥期間請勿懷孕或哺乳。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知醫師：

動脈血壓升高、體液滯留、體重增加、肌肉痙攣、黃疸伴有搔癢皮疹、乳房痛或溢乳、陰道出血、精神抑鬱、紅斑、藥疹。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

