



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0100



帝盟多[®]膠囊

Temodal[®] 20mg/100mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

帝盟多[®]膠囊 (Temodal[®] 20mg/100mg)

2009.12 修訂

藥品成分名：Temozolomide

藥品外觀：

Temodal[®] 20mg：黃色/白色，長圓柱形，硬膠囊；
標記：[TEMODAL；20mg]

Temodal[®] 100mg：白色/粉紅色，長圓柱形，硬膠囊；
標記：[TEMODAL 100mg]

作用

為一種抗腫瘤藥物，能殺死癌細胞而用來治療癌症。

服用指示

按您的醫師指示服用，因藥品易受食物影響，空腹(飯前1小時或飯後2小時)服用效果較好。

注意事項

1. 若您已知對此類藥物過敏或達卡巴仁(dacarbazine)過敏或有出血的問題時，請先告訴您的醫師。
2. 有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫(藥)師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
4. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
5. 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。

副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、落髮、頭暈、頭痛。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您