



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0101



賽得[®]膠囊

Thado[®] 50mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

賽得[®]膠囊 Thado[®] 50mg

2009.12 修訂

藥品成分名：Thalidomide

藥品外觀：黃橙/白雙色，長圓柱形，膠囊；

標記：[THADO][THADO]

作用

1. 治療痲瘋性結節性紅斑（俗稱痲瘋病）。
2. 治療多發性骨髓瘤的搭配療法，若需進一步資訊，可請教您醫（藥）師。
3. 作用在於調節免疫功能及抑制血管生長。

服用指示

按您的醫師指示服用，因藥品易受食物影響，空腹(飯前1小時或飯後2小時)服用效果較好。

注意事項

1. 若您曾經對 Thalidomide 過敏，請務必告知您的醫師（藥）師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

2. 在服用本藥品前，請務必確認您已詳讀使用同意書並簽章。
3. 若您正在懷孕或準備懷孕，請告知您的醫（藥）師，本藥可能會傷害胎兒，導致畸型；若在接受本藥品處方治療期間計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時確實做好避孕，以避免懷孕。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 服藥後常有想睡、疲倦、頭昏等副作用，建議您在睡前或晚餐後一小時服用本藥物。
2. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：疑似或發現懷孕、發燒、血壓嚴重下降、心跳

加快、紅斑性的皮膚疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、落髮、頭暈、頭痛、口乾、手腳麻、水腫、視力模糊。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。