



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0103



妥富腦[®]錠
Tofranil[®] 25 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

妥富腦[®]錠(Tofranil[®] 25 mg)

2010.02 修訂

藥品成分名：Imipramine HCl

藥品外觀：橘紅色，圓形，錠劑

作用

妥富腦[®]錠可用來調整精神狀態或治療夜尿症

用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病、青光眼，應告知您的醫生及藥師。
2. 藥物保存時請避免高溫、潮濕處。
3. 用藥物可能造成視力模糊，請避免操作機械及開車。
4. 服用此藥初期、劑量有改變時，容易有眩暈、視力模糊，甚至肌肉僵硬、行動緩慢。請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。尤其是老年人，請特別注意。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：口乾、便秘、流汗、面潮紅、視覺模糊。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。