



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0104

妥泰[®] 膜衣錠

Topamax[®] 100 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

妥泰[®]膜衣錠(Topamax[®] 100 mg)

2010.02 修訂

藥品成分名：Topiramate

藥品外觀：明黃橙，圓扁形，錠劑，大小：0.91 公分

標記：[TOP][100]

作用

1. 成人及 2 歲以上兒童局部癲癇。
2. 預防偏頭痛。

用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 可飯前或飯後服用
3. 有錠劑及分散型膠囊(Topamax sprinkle 25mg) 兩種劑型，不建議將錠劑剝開，若為不能吞服錠劑的患者，如兒童與老年人，可將分散型膠囊剝開服用，不需咀嚼。

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 須定期看醫生檢查治療進度，若需調整劑量、停

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

- 藥或改用其他藥物，須以遞減方式避免癲癇復發。
3. 肝腎功能不全之患者，應考慮調整劑量或服用次數，避免副作用產生。
 4. 會分泌至母乳中，因此不建議在治療期間哺乳。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 較常見的副作用為輕至中度，包括暈眩、嗜睡、頭痛、視力模糊等。
2. 有時會發生食慾不振、噁心嘔吐等副作用。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

可能增加跌倒的風險

1. 服用此藥物可能會產生暈眩、嗜睡、視力模糊等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。
2. 患者若癲癇發作時，也會增加跌倒風險。

