



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0105



特良高朗[®] 膜衣錠
Trancolon[®] 7.5mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

特良高朗[®] 膜衣錠 (Trancolon[®] 7.5mg)

藥品成分名：**Mepenzolate bromide**

藥品外觀：淡紅色，圓扁形，錠劑；大小：0.60 公分；標記：[434]。

作用

特良高朗[®] 膜衣錠是用以解除激躁大腸症所引起的大腸機能異常的藥物。

用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 對於青光眼、前列腺肥大、麻痺性腸阻塞之患者，請勿投與此藥物。
3. 甲狀腺機能亢進、高溫環境下之患者、及老年人建

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

議於謹慎監測下酌量降低服用的劑量。

4. 此藥物會產生頭痛暈眩及視力調節障礙症狀，患者避免從事需精神集中之工作，服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：噁心嘔吐、視力調節障礙、排尿障礙、暈眩頭暈、發疹。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。