



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0106

除癲達[®] 膜衣錠

Trileptal[®] 300 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

除癲達[®]膜衣錠(Trileptal[®] 300 mg)

2010.02 修訂

藥品成分名：Oxcarbazepine

藥品外觀：鮮橙黃色，長圓柱形，錠劑，大小：
1.5 公分，標記：[CG，CG][TE，TE]

作用

1. 局部癲癇發作之單一或輔助治療
2. 神經痛治療

用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 通常為一天服用兩次
3. 可飯前或飯後服用

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 須定期看醫生檢查治療進度，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，須以遞減方式避免癲癇復發。
3. 老年人或腎功能不全之患者，應考慮調整劑量或服用次數，避免副作用產生。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

4. 會分泌至母乳中，因此不建議在治療期間哺乳。
5. 酒精會增加此藥的鎮靜作用，盡可能避免。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每種藥都可能產生副作用，若發生副作用時請勿驚慌，可與醫師或藥師聯絡，評估是否繼續服用。
2. 常見的副作用大多為輕微至中度，且為短暫性的。包括頭暈、嗜睡、疲倦、噁心嘔吐、視覺障礙。
3. 其餘可能發生的副作用為運動失調、眼球震顫。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

可能增加跌倒的風險

1. 服用此藥物可能會產生頭暈、嗜睡、視覺障礙等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。
2. 患者若癲癇發作時，也會增加跌倒風險。

