



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0108



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

泰嘉[®]錠 Tykerb[®] 250 mg

2009.12 修訂

藥品成分名：Lapatinib Ditosylate

藥品外觀：橘色，橢圓形，錠劑；標記：[GSXJG]

作用

為抗腫瘤標靶治療之口服藥物，可用來治療進展性或轉移性的乳癌。

用法

此藥需空腹服用(飯前 1 小時或飯後 2 小時)，請依照醫師指示的時間服用。

注意事項

1. 若您已知對此類藥物過敏，請先告訴您的醫師。
2. 有肝、腎疾病，應告知您的醫（藥）師。
3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

4. 盡量避免或減少含酒精性飲料及葡萄柚汁的攝取，以免影響藥品的代謝及療效。
5. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
6. 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、手腳發紅、手腳腫痛、噁心嘔吐、食慾不振、腹瀉、發燒、咳嗽、寒顫、喉嚨痛。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

