



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0111



滅必治<sup>®</sup>軟膠囊  
Vepesid<sup>®</sup> 50mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

# 滅必治<sup>®</sup>軟膠囊 Vepesid<sup>®</sup> 50mg

2009.12 修訂

藥品成分名：Etoposide

藥品外觀：淡紅紫色，長圓柱形，軟膠囊；  
大小：2.2 公分

## 作用

為一種抗腫瘤藥物，能殺死癌細胞而用來治療癌症。

## 服用指示

1. 請依照醫師指示按時服用，不可自行增減藥量或任意停藥。
2. 飯前或飯後服用皆可，以水整顆吞服，不可嚼食或剝開膠囊，若出現胃部不適可與食物併服。

## 注意事項

1. 若您已知對此類藥物過敏，請先告訴您的醫師。
2. 有胃、肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫（藥）師。
3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

- 胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 盡量避免或減少含酒精性飲料的攝取，以免影響藥品的代謝及療效。
  - 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
  - 若您有服用以下藥物，如：阿斯匹靈、止痛劑、抗凝血劑、大蒜、人蔘、銀杏或維他命 E 等等，請在服用這些藥物前告知您的醫師。
  - 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。

### 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## 可能的副作用

1. 使用本藥後可能會造成噁心或嘔吐，以少量多餐的方式並且多漱口以加強口腔衛生。
2. 使用本藥後可能比較容易出血，所以必須小心避免受傷；建議使用軟毛牙刷和電動刮鬍刀，以避免皮膚和牙齦出血。
3. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、腹瀉、便秘、咳嗽、發燒、寒顫、喉嚨痛、落髮、頭暈、頭痛、視力模糊、皮膚或眼睛變黃。

## 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。