



# 臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0113

威克倦<sup>®</sup> 持續藥效錠

Wellbutrin<sup>®</sup> XL 150 mg



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 威克倦<sup>®</sup> 持續藥效錠 ( Wellbutrin<sup>®</sup> 150 mg )

2010.05 修訂

藥品成分名：Bupropion hydrochloride

## 作用

威博雋<sup>®</sup> 持續藥效錠適應症為憂鬱症、治療尼古丁依賴性，作為戒菸之輔助劑(自費)。

## 用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

## 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫師及藥師。
2. 服藥期間應嚴密監視憂鬱症情形，以防發生自殺行為。
3. 禁用於對本藥過敏者和癲癇患者。

## 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：發燒、胸痛、全身衰弱、心博過速、姿勢性低血壓、血壓升高、癲癇發作、失眠、震顫及注意力障礙等。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請與您的醫師聯絡。
3. 服用本藥治療期間，容易造成跌倒意外，請小心行動，以免發生危險。

## 保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。