



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0115



贊安諾[®]錠

Xanax[®] 0.25 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

贊安諾[®] 錠(Xanax[®] 0.25mg)

藥品成分名：Alprazolam

藥品外觀：藥品外觀：金箔片裝白色長橢圓形錠劑；

藥品標誌：一面刻[UPJOHIN 29]另一面
有一切痕。

作用

是一種苯二酚(Benzodiazepine)類的藥物，主要用於緩解焦慮及緊張感。

用法

請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

注意事項

1. 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
2. 使用此藥品前請勿吸煙、喝含酒精性的飲料及葡萄柚汁。
3. 使用此藥品後請勿開車或操縱精密的儀器，並小心走路預防可能發生的跌倒。
4. 在手術前需告訴醫生或藥師是否有其他並存的疾病(例如：中風、憂鬱症、心臟疾病、青光眼、

肝腎疾病、肺部及呼吸道的疾病、帕金森氏症、癲癇、重症肌無力等等)。

5. 若有服用其他藥物(包括保健食品)請先告知醫生或藥師。
6. 若有計劃懷孕(或是已經懷孕)及哺乳婦女者，請先告知醫生。
7. 對苯二酚(Benzodiazepine)類過敏者須在使用前告知醫生
8. 若需要進行其他手術或牙科處置時，需告知醫生。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：嗜睡、暈眩、疲倦、頭痛、噁心、皮膚癢、情緒不穩、暫時性的失憶等；通常只會出現在治療初期，繼續服用後通常症狀都會漸漸消失。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：憂鬱、睡眠障礙、不安、焦慮、心跳加快、眼睛變黃、講話困難、無法控制肌肉等，請立即

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

就醫。

保存方法

1. 儲存於室溫(20~25°C)乾燥處、避光、避熱保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

