



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0025

### 善寧<sup>®</sup>持續藥效膠囊

## Xanthium<sup>®</sup> 200 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 善寧<sup>®</sup>持續藥效膠囊(Xanthium<sup>®</sup> 200 mg)

2007.02 修訂

藥品成分名：Theophylline

藥品外觀：白色，長圓柱形，硬膠囊；大小：1.93公分；標記：無標記

## 作用

善寧<sup>®</sup>持續藥效膠囊為支氣管擴張劑，可用來解除因氣喘或其他肺部疾病引起的呼吸困難。

## 用法

1. 善寧<sup>®</sup>持續藥效膠囊必須維持血中濃度以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
2. 善寧<sup>®</sup>持續藥效膠囊可空腹或飯後服用，但請每天以相同方式服藥。
3. 善寧<sup>®</sup>持續藥效膠囊為緩釋劑型，應整粒吞服；以鼻胃管餵食的病人可以打開膠囊直接餵食，但請勿將膠囊內的微膠粒磨碎。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

## 注意事項

1. 對善寧<sup>®</sup>持續藥效膠囊或茶鹼類藥物過敏，請勿使用此藥。
2. 善寧<sup>®</sup>持續藥效膠囊和許多藥都有可能產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。
3. 懷孕或計畫懷孕、哺乳、有心、肺、肝、腎、甲狀腺機能亢進、消化性潰瘍或癲癇等方面的疾病，請先告知您的醫師。
4. 茶、咖啡、可樂及抽菸可能影響藥品的作用；若您平日有喝茶或咖啡的習慣，請告知您的醫師，因為可能需要調整劑量。
5. 請按時回診，因為醫生可能需要監測您的血中藥物濃度及評估藥品的療效。
6. 若有需要就診，請告知他科醫師或牙醫您正服用此藥。

## 忘記服藥時該怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。

## 可能的副作用

症狀	如何處理
噁心、嘔吐、胃痛、腹痛、食慾差	隨餐或飯後馬上服用，或與制酸劑併用，若症狀持續未改善，請與醫師聯繫
頭痛、精神不安、急躁、暈眩、頻尿、頭及手指肌肉抽筋	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
失眠、心跳快速、心悸、呼吸急促	您的劑量可能需要調整，請與醫師聯繫
異常行為、心悸、心律異常、微燒、呼吸急促、出汗、極度口渴、耳鳴、肌肉抽筋、經常嘔吐(嘔吐物為咖啡色)	請立即與醫師聯繫
皮膚起疹、皮屑、水泡	請立即與醫師聯繫

## 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您