


# 一般口服抗生素懸浮液之使用方法

0030

2009.12 修訂

本院品項有：Amolin<sup>®</sup> 60ml、Augmentin<sup>®</sup> 35ml、  
Ulexin<sup>®</sup> 60ml、Ulosina<sup>®</sup> 60ml



## 配製方法

1. 配製抗生素懸浮液前請先將藥瓶內之顆粒徹底搖鬆。
2. 藥瓶內先加入約半瓶高度之冷開水，並充分搖勻至無結塊。
3. 再次加入冷開水於藥瓶內，稀釋至藥瓶上的刻度處。
4. 加水配製後之抗生素懸浮液，請置於冰箱 4~8°C 冷藏。
5. 每次服藥前請先徹底搖勻懸浮液再使用。

## 忘記服藥時該怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量

## 注意事項

1. 懸浮液配製後，請儲放冰箱內，並於 7 日內服用完，若藥品超過保存期限請丟棄。。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。