

體內置放輸尿管雙J管病人注意事項

- 1.輸尿管雙J管為一矽質中空導管，其一端置放於腎臟，另一端置放於膀胱，其目的在於保持輸尿管暢通。
- 2.因病情需要，您的醫師已於 年 月 日在您的體內置放單側 雙側輸尿管雙J管。
- 3.請於 年 月 日回門診複診，並與您的主治醫師約定拔除雙J管的時間。
- 4.體內置放輸尿管雙J管可能引起的不舒服症狀如下：
 - (1)膀胱刺激症候群：頻尿、血尿、急尿。
 - (2)小便時腰酸痛。
 - (3)解便後下腹疼痛。
 - (4)雙J管如超過3個月未拔除或置換，可能導致尿液殘渣附著於雙J管上，引發導管阻塞，甚至尿路結石。又因各廠商導管材質不同，可能於拔除時發生斷裂情形，而需要進一步手術拔除。
- 5.如於放置輸尿管雙J管後發生嚴重血尿、腰痛、發燒超過 38.5°C 或尿失禁時，請速回泌尿科門診。

祝您健康愉快！



北醫健康諮詢專線(02)2738-7416



臺北醫學大學附設醫院 95.7
TAINPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL 印製