

《臺北醫學大學附設醫院用藥安全警訊通告》

期號	內容主題	PDF
100-05	公告含 diclofenac 成分藥品之仿單修訂事宜	
100-04	食品藥物管理局並未核准 terbutaline成分藥品用於預防或治療孕婦早產	
100-03	公告含雙磷酸鹽類(bisphosphonates)成分藥品再評估結果相關事宜	
100-02	食品藥物管理局說明含 propoxyphene成分藥品之風險效益評估情形	
100-01	含乙醯胺酚 (Acetaminophen) 藥品之用藥安全資訊	
99-051	食品藥物管理局說明將對「Avastin (bevacizumab)」用於治療乳癌之適應症進行療效再評估	
99-050	公告含 clopidogrel 成分藥品再評估相關事宜	
99-049	食品藥物管理局說明含 Propoxyphene成分藥品之用藥安全資訊	
99-048	食品藥物管理局提醒：性腺激素釋放素 (Gonadotropin-releasing hormone, GnRH) 促進劑類藥品之安全資訊	
99-047	食品藥物管理局說明媒體報導「臺灣首例疑似使用Avandia藥品致死案例」	
99-046	食品藥物管理局說明rosiglitazone成分藥品各國使用現況	
99-045	食品藥物管理局提醒醫師，衛生署並未核准 Avastin 藥品治療黃斑性病變之適應症	
99-044	檢送含 sibutramine 成分藥品「藥品安全資訊風險溝通表」	
99-043	食品藥物管理局提醒醫師，應儘量避免使用含 Gadolinium成分顯影劑於患有嚴重腎臟疾病之病人	
99-042	食品藥物管理局提醫療人員使用 tigecycline成分藥品之用藥安全資訊	

99-041	食品藥物管理局再度提醒巴金森氏症藥品 Stalevo 善之用藥安全資訊	
99-040	食品藥物管理局說明非類固醇抗炎藥品 (NSAIDs) 之用藥安全資訊	
99-039	有關「含 Mannitol 成分注射劑」之使用安全資訊	
99-038	食品藥物管理局提醒醫療人員及病患使用 lamotrigine 成分藥品可能發生嚴重但罕見的無菌性腦膜炎	
99-037	食品藥物管理局提醒使用含 daptomycin 藥品之用藥資訊	
99-036	食品藥物管理局提醒：使用 leflunomide 成分藥品應謹慎監視病患肝功能	
99-035	食品藥物管理局說明第二型糖尿病治療藥物梵帝雅 (Avandia) 之評估情形	
99-034	食品藥物管理局提醒醫療人員及病患使用 Lyrica 藥物可能導致自殺意念或企圖之副作用	
99-033	提升使用 carbamazepine 藥品之病人用藥安全，衛生署將加強管理並建置三道把關機制	
99-032	食品藥物管理局說明一項研究報告發現使用高劑量的 insulin glargine 成分藥品可能增加罹患癌症之風險，但因果關係尚未確認	
99-031	食品藥物管理局提醒醫療人員及女性使用子宮內投藥系統 Mirena 避孕，宜小心罕見但嚴重的子宮穿孔之不良反應	
99-030	食品藥物管理局提醒醫療人員及病人注意，使用骨質疏鬆治療藥品 zoledronic acid，宜小心監視腎臟功能	
99-029	國外終止 Nexavar 藥品之第三期臨床試驗計畫，國內並無參與此臨床試驗計畫，但提醒宜小心肝功能之監測	
99-028	含 carbamazepine 成分藥品可能引起罕見但嚴重之史蒂文生氏-強生症候群等不良反應	

99-027	用合 Tramadol 藥品應謹慎監控病患可能產生自殺之風險，且需注意該成分藥品濫用或非法使用情形之發生	
99-026	食品藥物管理局提醒醫療人員，輸注含 Bevacizumab成分藥品時應注意病患產生過敏或輸注反應	
99-025	食品藥物管理局提醒含Tramadol藥品之用藥安全資訊	
99-024	食品藥物管理局再次提醒使用含Orlistat成分藥品應謹慎監視肝功能	
99-023	有關人類輪狀病毒疫苗Rotarix 及 RotaTeq 存在豬環狀病毒等訊息	
99-022	食品藥物管理局提醒含sildenafil藥品之用藥安全資訊	
99-021	食品藥物管理局提醒選擇性血清素再吸收抑制劑抗憂鬱藥之用藥安全資訊	
99-020	食品藥物管理局再次提醒巴金森氏症治療藥物多巴胺促進劑可能引起衝動控制障礙之不良反應	
99-019	食品藥物管理局提醒：過度使用胃食道逆流疾病治療藥物，氫離子幫浦抑制劑可能增加年長婦女骨折或感染之風險	
99-018	食品藥物管理局提醒：阿滋海默型失智症治療藥品rivastigmine貼片劑之用藥安全資訊	
99-017	食品藥物管理局提醒：性腺激素釋放素（Gonadotropin-releasing hormone，GnRH）促進劑類藥品之安全資訊	
99-016	食品藥物管理局提醒使用含promethazine HCl注射劑之用藥安全資訊	
99-015	食品藥物管理局提醒Bufexamac藥品具有引起嚴重接觸性過敏反應之風險	
99-014	食品藥物管理局提醒醫師letrozole成分藥品適應症為治療乳癌，非用於治療婦女不孕症	

99-013	食品藥物管理局提醒：治療痤瘡藥品 isotretinoin (A 酸) 應小心監視其不良反應	
99-012	有關降膽固醇藥品 simvastatin 之用藥安全資訊	
99-011	食品藥物管理局提醒巴金森氏症藥品 Stalevo 之 之用藥安全資訊	
99-010	食品藥物管理局提醒使用抗生素Moxifloxacin可能產生之不良反應	
99-009	食品藥物管理局提醒：使用高劑量降膽固醇藥品simvastatin宜小心肌肉疼痛之不良反應	
99-008	食品藥物管理局提醒：紅血球生成素 (Erythropoiesis Stimulating Agent) 之用藥安全資訊	
99-007	食品藥物管理局再次提醒：治療骨質疏鬆之雙磷酸鹽類藥品之安全性	
99-006	食品藥物管理局提醒：使用Baxter生產之免疫球蛋白藥品Rho(D)可能導致血管內溶血之併發症	
99-005	Invirase(saquinavir)和 Norvir(ritonavir)併用可能會導致心臟方面嚴重不良反應	
99-004	食品藥物管理局提醒：長期使用荷爾蒙替代療法治療更年期症候群可能增加肺癌之風險	
99-003	衛生署再次呼籲醫師及病患使用第二型糖尿病治療藥物應嚴密監視可能之副作用	
99-002	衛生署食品藥物管理局說明含 Sibutramine 成分藥品之風險效益再評估情形	
99-001	補充說明本署 97 年 8 月 18 日衛署藥字第 09Y0329 昨日醉神悅和神病藥品之仿單應加刊警語公告事宜。	
98-049	衛生署再次提醒使用控制體重藥品Sibutramine 應小心監視心血管方面不良事件	
98-048	衛生署提醒：使用控制體重藥品Sibutramine應小心監視心血管方面不良事件	
98-047	公告含 Clopidogrel 類藥品仿單應加刊警語	
98-046	衛生署提醒：術後放置關節內止痛輸注局部麻	

	醉劑宜小心關節內軟骨溶解之不良反應	
98-045	衛生署提醒醫師及病人注意，使用抗癌藥物 Nexavar宜小心肝臟方面之不良反應	
98-044	衛生署提醒Exenatide藥品可能引起急性腎衰竭之不良反應	
98-043	衛生署提醒醫師及病人小心監視 Iron Dextran藥品可能引起過敏性休克之不良反應	
98-042	Zanamivir (Relenza Inhalation Powder)藥物使用警訊	
98-041	"衛生署再次呼籲醫療人員及婦女使用避孕藥使用 小心監測血栓形成之風險"	
98-040	衛生署再次提醒醫師為輸血病人處方 Deferasirox 成分藥品應監視其肝腎衰竭等不良反應	
98-039	衛生署提醒醫療人員及病人含Sitagliptin成分藥品可能引起急性胰臟炎之不良反應	
98-038	衛生署提醒：使用含Promethazine hydrochloride 成分藥品應小心注射部位滲漏導致組織損傷	
98-037	衛生署呼籲醫療人員及病人注意長期使用含可待因成分藥品有導致成癮的疑慮	
98-036	公告含 Pynin 類藥品安全性再評估	
98-035	反轉錄病毒感染治療藥品Etravirine可能引起嚴重皮膚不良反應	
98-034	Orlistat (Xenical 囍)導致肝臟相關的不良反應案例	
98-033	衛生署提醒正在使用Warfarin類抗凝血劑之病患，如併服克流感，應小心偵測其凝血功能	
98-032	衛生署提醒民眾切勿自行購買處方藥	
98-031	Tumor necrosis factor blockers 可能會增加小孩和青少年族群發生淋巴癌和其他癌症的危險	
98-030	公告含 allopurinol 藥品仿單加刊注意事項內容相關事宜	

98-029	氣喘用藥 Xolair 安全資訊	
98-028	衛生署提醒民眾切勿過量使用含乙醯胺酚 (Acetaminophen) 成分藥品以防肝傷害	
98-027	有關外電報導Lantus與癌症之關連性	
98-026	衛生署再次呼籲：病患服用輔助戒菸藥品宜小心神經精神症狀之不良反應，並避免駕車或操作機械	
98-025	衛生署說明含Dextropropoxyphene成分藥品之安全資訊	
98-024	Cefepime (Maxipime [®])安全警訊之後續追蹤報告	
98-023	衛生署提醒醫療人員以興奮劑治療小孩無法集中注意力時，宜注意可能發生之不良反應	
98-022	衛生署提醒醫療人員及病人氣喘治療藥品 Leucotriene modifiers之安全資訊	
98-021	衛生署再次提醒醫療人員及病患注意甲狀腺機能亢進治療藥物Propylthiouracil可能引起肝臟之嚴重不良反應	
98-020	衛生署提醒醫療人員及病患「氫離子幫浦抑制劑」可能降低抗凝血藥品Clopidogrel之療效	
98-019	人類白血球抗原 HLA-B*5701基因型可能與抗生素製劑Flucloxacillin引起肝傷害有關	
98-018	衛生署提醒治療勃起功能障礙之「PDE-5抑制劑」不可併用治療前列腺肥大之「非選擇性腎上腺素受體拮抗劑」	
98-017	衛生署提醒醫療人員及病患使用得舒緩 (Tarceva)藥品應注意不良反應	
98-016	衛生署提醒水楊酸類藥品之用藥安全資訊	
98-015	衛生署提醒民眾使用含尼古丁 (Nicotine) 成分之戒菸輔助劑仍應小心副作用	
98-014	Ceftriaxone (Rocephin [®])與含鈣溶液交互作用之警訊更新	
98-013	衛生署重申含尼古丁 (Nicotine) 成分之戒菸輔助劑須經衛生署審核通過，以保障民眾用藥安	

	全	
98-012	衛生署提醒醫療人員及病患注意甲狀腺機能亢進治療藥物 Propylthiouracil可能引起小孩肝功能低下之風險	
98-011	衛生署提醒醫療人員，病患於MRI掃描時 應去除含金屬背膠之貼片以避免灼傷	
98-010	衛生署說明癲癇輔助治療藥品Zonisamide之藥安全資訊	
98-009	衛生署說明腸胃障礙治療藥品Metoclopramide之藥安全資訊	
98-008	CellCept 藥物使用指引須分發給每位使用CellCept 的病人	
98-007	Clopidogrel (Plavix [®])使用於某些病人族群時藥效較低	
98-006	請持有 nimesulide 成份製劑藥品許可證之廠商於98年4月12日前依說明段檢附資料至署辦中文仿單變更登記事宜	
98-005	衛生署再次提醒鎮靜安眠劑使蒂諾斯可能導致夢遊之不良反應	
98-004	衛生署再次提醒局部麻醉劑之藥安全資訊	
98-003	降膽固醇藥品之安全資訊	
98-002	衛生署再次呼籲使用抗精神病藥品應嚴密監視其不良反應	
98-001	衛生署提醒:Mycophenolate成分藥品之藥安全資訊	
97-052	衛生署公告：含 Metformin 成分藥品之仿單應加刊警語注意事項相關事宜	
97-051	衛生署提醒醫療人員及病患使用腸灌洗液應補充足量水分	
97-050	衛生署提醒醫師為病患處方抗癲癇藥物時應謹慎監視嚴重皮膚不良反應	
97-049	雙磷酸鹽類藥物(Bisphosphonates)潛在發生心房顫動之危險性	

97-048	衛生署再次呼籲：病患服用輔助戒菸之 Varenicline 藥品宜小心神經精神症狀之不良反應，並避免駕車或操作機械	
97-047	衛生署提醒：麻醉劑 Propofol 成分藥品之用藥安全資訊	
97-046	UPLIFT 臨床試驗初步結果：使用 Tiotropium bromide (Spiriva [®] HandiHaler) 不會有較高發生中風的機率	
97-045	中度肝功能不全的癌症病人使用 Erlotinib (Tarceva [®])，發生肝衰竭或肝腎症候群，甚至有致命危險	
97-044	衛生署再次提醒慢性阻塞性肺疾治療藥物 Tiotropium bromide 藥物安全資訊	
97-043	衛生署提醒使用 Ethambutol 藥品治療結核病	
97-042	使用抗腫瘤壞死因子製劑治療，應注意黴菌感染之發生	
97-041	Pasca gel 仿單內容變更：如對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象，使用前請與醫師或藥師磋商	
97-040	Diphenhydramine (Diphenhydramini [®]) 輸注過快導致之藥物不良反應事件	
97-039	降膽固醇藥品 Vytorin (Simvastatin/Ezetimibe) 藥品安全資訊	
97-038	衛生署提醒醫師併用 Simvastatin 與 Amiodarone 治療病患時應小心橫紋肌溶解症之不良反應發生	
97-037	Ponstan 仿單內容變更：Mefenamic acid 可能導致發生新的高血壓或使原本的高血壓惡化	
97-036	衛生署提醒：抗癌藥物 Mitoxantrone 可能引起心臟之不良反應	
97-035	Aminoglycosides 使用在肝硬化病人所引起之嚴重藥物不良反應案例	
97-034	衛生署再次提醒醫療人員及病患，使用抗癲癇	

	藥品嚴防自殺傾向	
97-033	Moxifloxacin (Avelox [®])引起的肝功能異常之藥物不良反應事件	
97-032	Fluoroquinolones 可能增加肌腱炎和肌腱斷裂的風險	
97-031	衛生署再次呼籲：使用非類固醇抗發炎劑 Nimesulide 成分藥品宜小心肝功能	
97-030	衛生署再次提醒：mycophenolate成分藥品之用藥安全資訊	
97-029	衛生署提醒抗 HIV 感染治療藥物 Abacavir 安全資訊	
97-028	衛生署提醒：使用多發性骨髓瘤治療藥物 Bortezomib 藥物應小心肺臟與心臟之不良反應	
97-027	衛生署提醒：使用抗精神病藥品應嚴密監視其不良反應	
97-026	Etanercept (Enbrel [®])可能造成嚴重感染及肺結核之不良反應	
97-025	衛生署再次提醒 mycophenolate 成分藥品之用藥安全資訊	
97-024	衛生署再次呼籲醫師使用抗血栓溶解藥物 Aprotinin 應小心可能發生大出血之不良反應	
97-023	衛生署說明製品含葡萄糖胺成分之管理類別	
97-022	衛生署來函公告：Ketorolac 成分藥品之注射劑型統一適應症，及口服與注射劑型仿單應加刊警語相關事宜	
97-021	衛生署說明「疑似因使用避孕貼片導致昏迷」之不良反應通報案例	
97-020	衛生署再次提醒婦女使用女性避孕藥品應經醫師處方下使用，並應小心不良反應之發生	
97-019	癌症治療藥品之用藥安全資訊	
97-018	糖尿病治療藥物 Excubera 之安全資訊	

97-017	Mycophenolate成分藥品之用藥安全資訊	
97-015	衛生署提醒醫療人員及病患氣喘治療藥物 Montelukast(Singulair [®])用藥安全資訊	
97-014	衛生署呼籲嬰幼兒使用感冒藥應經醫師診治不可自行購買使用	
97-013	吸入性全身麻醉劑 Suprane藥物安全資訊	
97-012	B型肝炎治療藥物安全資訊	
97-011	"衛生署提醒：有心肺疾病病人應避免使用多發性骨髓瘤治療藥物 Bortezomib"	
97-010	Botox 可能產生呼吸失調和死亡之藥物不良反應	
97-009	日本初步研究顯示服用克流感並不會導致行動異常行爲，衛生署仍呼籲醫療人員及病人宜謹慎評估用藥風險	
97-008	衛生署提醒：使用 Spivira 治療一年的病人，較安慰劑組有較高中風之風險	
97-007	Zolpidem (Stilnox [®])導致意識混亂之藥物不良反應事件	
97-006	衛生署呼籲：應正確使用氣喘及慢性阻塞性肺疾吸入性治療藥物	
97-005	衛生署來函：有關 Carbamazepine 等 11 種抗癲癇藥品有增加病患服藥後出現自殺意念或行爲等不良反應之風險	
97-004	衛生署新聞稿：Sunitinib (Sutent [®] 紓癌特)可能引起心血管不良反應	
97-003	衛生署呼籲：Ketorolac 成分藥品不得做爲退燒用途	
97-002	衛生署呼籲：最近曾發生中風之病人服用 Atorvastatin 可能增加出血性中風的危險	
97-001	雙磷鹽類藥物可能引起嚴重骨骼、關節及/或骨骼肌疼痛之不良反應	

聲明

本院藥劑部所有資料內容和目的，是提昇大家對藥物使用及疾病的基本認識，進而提昇病人之用藥安全，其中所有衛教資料並非一定的治療指引，文中任何資料都不能取代專業醫療人員的指導和建議。若您對本身健康或疾病治療上有任何疑問時，應到醫療院所請教醫師及專業人員，切記只有合法醫師才能替您診治疾病。