



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0037



安納柔[®]膜衣錠
Anazo[®] 1mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

安納柔[®]膜衣錠 (Anazo[®] 1mg)

2011.03 修訂

藥品成分名：Anastrozole

藥品外觀：白色，圓形，錠劑；大小：0.6 公分；

作用

乳癌輔助治療藥品，並預防復發。

用法

- 1.請遵照醫師指示服用，勿任意更改劑量或停藥。
- 2.一般為每天服用一錠，若有腸胃道不適，可與食物或牛奶併服。

注意事項

1. 有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 使用安納柔膜衣錠後，可能會產生熱潮紅，穿著涼爽的衣服或待在涼爽的環境會有所幫助。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：疲倦、虛弱、喉嚨痛、關節疼痛、陰道搔癢或有分泌物。
2. 若有下述症狀，請告知您的醫師：胃痛、噁心嘔吐、胸部疼痛，呼吸短促，手或腳發紅、發熱及腫脹，手腳麻或無力，頭暈、頭痛。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。