



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0061



憂停<sup>®</sup>膜衣錠  
Eutac<sup>®</sup> 150 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 憂停<sup>®</sup>膜衣錠(Eutac<sup>®</sup> 150 mg)

2010.05 修訂

藥品成分名：Moclobemide

藥品外觀：淡黃，橢圓形，錠劑；大小：1.45 公分；  
標記：[ST][150]

## 作用

憂停<sup>®</sup>膜衣錠具有調節情緒作用。

## 用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

## 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝臟疾病，應告知您的醫師及藥師。
2. 已知對本藥產生過敏反應者不建議使用。
3. 避免飲用啤酒、食用乳酪類及醃製類食物。
4. 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

## 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若發生以下情形，請您不用過於擔心：睡眠障礙、焦慮、暴躁、暈眩、頭痛、視力改變與皮膚過敏(紅疹、搔癢、蕁麻疹、發紅)等，大部分可因持續治療而消失。

### 保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。