



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0062

服爾伊得安[®]錠

Fluitran[®] 2 mg



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

服爾伊得安[®]錠(Fluitran[®] 2 mg)

2010.05 修訂

藥品成分名：Trichlormethiazide

藥品外觀：淡紫紅色，圓扁形，錠劑；

大小：0.7 公分；標記：[S]

作用

服爾伊得安[®]錠為口服的利尿劑，主要治療高血壓。

用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

注意事項

1. 有糖尿病或痛風傾向之患者，偶會引起糖質與尿酸之代謝或排泄之異常，需注意。
2. 肝硬化患者、腎功能障礙之患者，以及需連續大量使用此藥品者須特別小心使用。
3. 服用此藥會引起尿量增加，所以請於白天服用可以減少睡眠干擾。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。

2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：噁心、顏面潮紅、亦有因食鹽減少而引起輕度筋痙攣，此外如皮膚發疹或便秘等現象也會產生。
2. 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：心跳不規律、肌肉抽搐、四肢無力等症狀，請立刻聯絡您的醫師。
3. 服用服爾伊德安[®]錠可能會增加病患如廁的頻率，由病床至如廁的整個過程容易跌倒，須小心注意。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。