



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0074

普治敏<sup>®</sup>錠

Lonzumin<sup>®</sup> 25mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444

E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

# 普治敏<sup>®</sup>錠(Lonzumin<sup>®</sup> 25mg)

2011.03 修訂

藥品成分名：Buclizine dihydrochloride

藥品外觀：白色，圓形，錠劑；大小：0.6 公分

## 作用

普治敏<sup>®</sup>錠為口服的抗組織胺製劑，用於治療蕁麻疹、因過敏引起之鼻炎、氣喘、皮膚炎，同時對昆蟲螫傷、暈車、暈船、噁心嘔吐也有效。

## 用法

1. 請於飯後服用。
2. 若為一天一次宜於晚上或睡前服用。
3. 若為防止暈車、暈船，應於出發前一小時服用。
4. 5-12 歲小孩劑量應減半。

## 注意事項

1. 幼兒安全劑量尚未完全建立，應經醫師藥師指示使用。
2. 孕婦禁用本藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 從事駕駛及操作重型機械者，請謹慎使用，預防意外發生。
4. 由於本藥可能引起嗜睡，避免因注意力不集中，造成跌倒情形發生。
5. 服用期間避免喝酒。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 此藥可能會有嗜睡、口乾、頭痛、緊張等現象，若有上述情形不必驚慌，可於睡前服用，可避免這些不便。
2. 服藥後，若有輕度低血壓眩暈、嗜睡、食慾不振、口、喉、鼻乾燥、視覺模糊、視神經過敏等現象出現，應立即停止用藥並就醫。

### 保存方法

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

### 可能增加跌倒的風險

服用此藥物可能會產生頭暈、嗜睡、視覺障礙等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。

