

雙和醫院以達文西手術摘尿路上皮癌，傷口僅 5 公分



1 名年約 58 歲的蔡姓婦人，有定期洗腎的病史，如廁時發現血尿，進而前往雙和醫院就診。經儀器與切片檢查，確診罹患了「尿路上皮癌」，為避免癌症轉移復發，施行達文西泌尿系統全切除手術，術後第 2 天即可下床，恢復狀況良好。

雙和醫院泌尿科高偉棠醫師表示，依蔡女士的病況，需切除雙側腎臟、輸尿管、膀胱、子宮及骨盆腔淋巴結等 6~7 公斤器官。若依傳統手術，開刀範圍需從胸骨開至恥骨，傷口約 20 至 30 公分，手術需耗時 5 至 10 小時，術後需兩天後才能下床。蔡女士因應現代醫療科技的發展，選擇了達文西手術，手術耗時 5 小時以內，傷口僅 5 個各約 1 公分的小洞，總傷口面積僅 5 公分，手術出血量約 500cc，不僅傷口小、疼痛較少、出血量少，術後也不必擔心需定期追蹤的問題。



【右圖：高偉棠醫師陳述病症轉移的位置】

尿路上皮癌最常見的症狀是偶發性血尿、腰痛等，一旦病人有厭食、體重減輕、倦怠乏力、發熱、盜汗、咳嗽時，或有洗腎的病史，應更嚴謹評估癌症是否有轉移的可能。高醫師指出，罹患尿路上皮癌病人有 9 成曾有無痛血尿的經驗，以蔡女士為例，血尿不是每天都有，排尿過程無疼痛感和不舒服，經尿路攝影與腹部電腦斷層攝影等檢查發現異常，再加上病人有長期洗腎的病史，因此高醫師建議藉由輸尿管鏡進行病理切片後，進一步確診為尿路上皮癌。

據臺灣醫學會統計，臺灣罹患尿路上皮癌的病人每年約新增 1,000 例，發生率為美國的 5 倍以上，也比日本、新加坡、菲律賓等國高出 4~5 倍之多，而國外男性發病率是女性的 2 倍。高醫師就臨床經驗上表示，臺灣不僅發生率高，在性別比較上，女性亦較男性多，女性發生率為 52%，男性為 48%。尿路上皮癌早期發現、早期治療，病人的 5 年存活率可達 9 成，因此高醫師建議，血尿是身體發出的一種警訊，民眾應儘速前往泌尿科就醫，查清楚原因；如果證實為腫瘤，不要害怕治療，醫師會依病人個別的狀況，包括年齡、身體條件、腫瘤的嚴重度等，提供適合的治療方案。（文/雙和醫院）

【下圖：高醫師說明達文西手術施行的範圍】

