


北醫附醫呼籲早期發現零期乳癌及早治療，預後極佳

臺北醫學大學附設醫院根據文獻資料指出，患有乳房乳管原位癌患者若經由適當治療，其 10 年存活率約 98~99%，幾近痊癒；若不加以治療則在臨床上發現約 25~35% 的病人在 10~15 年內會發展成侵犯性乳癌。



臺北癌症中心副院長暨乳房醫學中心主任杜世興說明，乳管原位乳癌是惡性乳管細胞在乳管管腔內繁殖增生，它是衍生成侵犯性乳癌的前趨病灶，乳管原位乳癌九成以上是經由乳房 X 光攝影發現惡性鈣化點而經組織切片得知，少部分臨床上經觸診察覺、乳頭異樣分泌而發現。

一般乳管原位癌治療不外乎：只切除腫瘤，或在腫瘤切除加上術後放射線治療及（或）荷爾蒙治療，或單純性乳房全切除等 3 種方式。乳管原位癌在施行乳房切除術後一般不需輔加荷爾蒙治療，也不用化學治療；但若是施行部分乳房切除手術且雌激素受體陽性者，可給予 5 年 Tamoxifen 荷爾蒙治療。【左圖：乳房 X 光攝影發現惡性鈣化點】



杜世興副院長同時也指出，乳管原位癌是零期乳癌，預後極佳，術後不用輔以化學治療。早期發現主要靠乳房 X 光攝影而偵測出，乳房切除治療幾可痊癒，但還有高比率患者僅接受乳房保留手術即可。【右圖：副院長暨乳房中心主任杜世興醫師】

（文/北醫附醫）