

[Antipain patch 40mg/patch 伏痛 貼布] - [Flurbiprofen]

藥師

藥劑部藥師 發佈日期

2011/10/10

<藥物效用>

緩解關節症、腱鞘炎、筋肉痛、外傷後腫脹、疼痛等症狀

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.使用時搭配所附固定貼布
- 2.建議兩天貼一片，一片貼 6 至 8 小時
- 3.可切割適當大小，若關節等易脫落部位可使用伸縮繃帶
- 4.患部有濕汗或污垢，貼用前須先清洗拭乾

<其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：
腹痛、腹瀉、頭痛、消化不良、噁心、水腫
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

<藥品外觀>

鋁箔包白色貼布

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。