

[Cortema Enema 100mg/60ml 可體灌腸液 ] - [Hydrocortisone ]

藥師

藥劑部藥師 發佈日期

2011/10/10

#### <藥物效用>

潰瘍性結腸炎輔助治療

#### <服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

#### <注意事項>

- 1.每天晚上使用，向左側臥每 30 分鐘翻身一次，最好能忍一小時以上再排出
- 2.使用 3~5 天通常可得到緩解
- 3.通常療程為 3 週，3 週後應逐漸減少用量。

#### <其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

#### <副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：  
干擾體液電解質平衡，肌肉無力
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

#### <藥品外觀>

黃色瓶裝

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。