

[Parlodel 2.5mg/tab 保乳調 錠] - [Bromocriptine mesylate]

藥師 藥劑部藥師 發佈日期 2011/10/10

<藥物效用>

控制帕金森氏症、治療泌乳激素分泌過多引起的相關症狀

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.建議飯後服用以減少胃腸不適
- 2.服藥後可能嗜睡，開車或從事機械操作需特別小心

<其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：
便秘、噁心、嘔吐、暈眩、姿勢性低血壓
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

<藥品外觀>

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.70 公分；標記：[X，C][S]

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。