

[Propecia 1mg/tab 柔沛錠] - [Finasteride]

藥師

藥劑部藥師 發佈日期

2011/10/10

<藥物效用>

禿頭用藥，增髮劑

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.孕齡婦女及小孩勿觸裂損藥錠，以免胎兒發展異常;不慎勿觸，請立即以肥皂及大量清水沖洗
- 2.服藥期間及停藥後一個月請避孕，且勿捐血

<其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：
過敏、射精困難、性慾降低、水腫
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

<藥品外觀>

淺紅色，八邊形，膜衣錠;大小: 0.78 公分；標記：[PROPECIA]

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。