

[Sabril F.C 500 mg/tab 赦癲易錠] - [Vigabatrin]

藥師

藥劑部藥師 發佈日期

2011/10/10

#### <藥物效用>

輔助控制癲癇或痙攣及其他用途

#### <服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

#### <注意事項>

- 1.未經醫囑勿突然停藥
- 2.可能引起嗜睡，操作機器或開車時請小心。

#### <其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物（包含處方藥、非處方藥及中藥）。

#### <副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：  
頭痛、暈眩、神經緊張、腸胃不適、視覺模糊
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

#### <藥品外觀>

白色，橢圓形，錠劑；大小：1.70 公分；標記：[SABRIL]

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。