

[Sucrate gel suspension 1g/5ml/bag 舒胃懸浮液 ] - [Sucralfate ]

藥師

藥劑部藥師 發佈日期

2011/10/10

<藥物效用>

胃黏膜保護劑、治療消化性潰瘍

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.需飯前 1 小時或飯後 2 小時服用以達最佳療效
- 2.和少許水混合後服用
- 3.請勿與其它藥物併服
- 4.如引起便秘請多喝開水

<其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：  
便秘、噁心、嘔吐
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

<藥品外觀>