

[TEGRETOL CR 200 mg/tab 癲通 長效錠 ] - [Carbamazepine ]

藥師                      藥劑部藥師 發佈日期                      2011/10/10

#### <藥物效用>

控制癲癇、緩解神經痛、情緒穩定劑

#### <服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

#### <注意事項>

- 1.勿服用葡萄柚汁。
- 2.本藥可能發生罕見嚴重皮膚過敏反應，如史蒂文生氏強生症候群/毒性表皮溶解症等不良反應，如出現喉嚨痛嘴巴破眼睛癢皮膚紅疹等應立即停藥回診。

#### <其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

#### <副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：  
嗜睡、頭痛、腸胃不適、搔癢、出血、黃疸、發燒
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

#### <藥品外觀>

淺橙色，長圓柱形，錠劑，大小:6mm，標記：[C；G][H；C]

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。