

[Thado 50mg/cap 賽得 膠囊] - [Thalidomide]

藥師

藥劑部藥師 發佈日期

2011/10/10

<藥物效用>

治療麻瘋性結節性紅斑、多發性骨髓瘤及其他腫瘤

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.孕婦禁用
- 2.服藥期間應採取避孕，不可哺乳
- 3.若出現皮疹、黏膜潰瘍等現象請立即停藥就醫。

<其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：
便秘、四肢發麻刺痛、嗜中性白血球減少、水腫、全身紅疹
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

<藥品外觀>

黃橙/白雙色，長圓柱形，硬膠囊；標記：[THADO][THADO]

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。