

[Trenfylline 400mg/tab 循血敏 持續性膜衣錠 ] - [Pentoxifylline ]

藥師 藥劑部藥師 發佈日期 2011/10/10

**<藥物效用>**

促進血液循環

**<服藥指示>**

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

**<注意事項>**

- 1.飯後服用可減少腸胃不適
- 2.不可嚼碎或磨粉以免影響藥效
- 3.若出現胸痛、心悸請與醫師藥師聯絡

**<其他注意事項>**

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

**<副作用>**

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：  
噁心、嘔吐、心悸、潮紅、過敏、水腫
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

**<藥品外觀>**

白色，橢圓形，錠劑；大小：1.80 公分；標記：[CCP]

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。